



ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΓΩΝ ΑΚΑΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ

ΕΙΔΗ ΑΚΑΡΕΩΝ	ΧΗΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ-ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ											ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
		Ιαν	Φεβ	Μαρ	Απρ	Μαι	Ιουν	Ιουλ	Αυγ	Σεπ	Οκ	Ν		Δ
													<p>Panonychus ulmi (Κόκκινος τετράνυχος της μηλιάς) Tetranychus urticae (Κίτρινος τετράνυχος)</p> <p>Οι τετράνυχος συνήθως εγκαθίστανται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και με την βοήθεια των στίλετών (χηληκεράτων) που διαθέτουν, διατρύπουν την φυλλική επιδερμίδα και απομυζούν τους φυτικούς χυμούς, προκαλώντας κακή λειτουργία στη φωτοσύνθεση και στη διαπνοή του φυτού. Τα προσβεβλημένα φύλλα χάνουν την στιλπνότητα, σταχτιάζουν και παρουσιάζουν πρόωγη γήρανση. Τα συμπτώματα είναι περισσότερο έντονα τη περίοδο του θέρους. Η αντιμετώπιση αρχίζει την άνοιξη (μέσα Μαΐου) και συνεχίζεται μέχρι τα τέλη Ιουλίου ανάλογα με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και την ένταση της προσβολής.</p> <p>Bryobia rubrioculus</p> <p>Στα δέντρα εμφανίζεται νωρίς την άνοιξη. Προσβάλλει όλα τα πράσινα μέρη του δέντρου και προκαλεί στα φύλλα γκριζοπράσινες κηλίδες, δεν κάνει ιστούς και σπάνια προκαλεί πτώση των φύλλων. Στη χώρα μας δεν αποτελεί ιδιαίτερο οικονομικό πρόβλημα.</p> <p>Aculus fockeui = Aculus cornutus</p> <p>Τα προσβεβλημένα νεαρά φύλλα την άνοιξη καρουλιάζουν. Το θέρους αυτά αποκτούν μία αργυρόχροη όψη που μπορεί να καλύψει και όλη την επιφάνεια του φυλλικού ελάσματος, γεγονός που προδίδει από μακριά την παρουσία του <i>A. cornutus</i> στον οπωρώνα. Τα προσβεβλημένα δέντρα χάνουν την ζωτικότητα τους και τα προσβεβλημένα φύλλα πέφτουν πρόωρα. Η αντιμετώπιση ξεκινάει αργά την άνοιξη και συνεχίζεται μέχρι τα μέσα Αυγούστου ανάλογα με την ένταση της προσβολής.</p> <p>Χημική Καταπολέμηση</p> <p>Για την επιτυχία της χημικής καταπολέμησης σημασία έχει: η έγκαιρη διάγνωση της προσβολής και η άμεση επέμβαση με ένα από τα εγκεκριμένα ακαρεοκτόνα πριν τα ακάρεα αναπτυχθούν σε μεγάλους πληθυσμούς. Η συχνή εναλλαγή των δραστικών ουσιών περιορίζει και επιβραδύνει την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας. Ο ρυθμός των επεμβάσεων ποικίλλει ανάλογα με το ακαρεοκτόνο. Οι οδηγίες των παρασκευαστών οίκων θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά προς αποφυγή φυτοτοξικών και άλλων φαινομένων στα φυτά και στον άνθρωπο. Τα διασυστηματικά σκευάσματα που έχουν ακαρεοκτόνο δράση δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται την περίοδο που τα φύλλα είναι προχωρημένης ηλικίας διότι δεν απορροφούνται σε ικανοποιητικό βαθμό.</p>	
	χειμερινά λάδια ¹	Ανθοφορία	Μετά την άνθηση	Θέρος-Τέλος εποχής	Πτώση φύλλων									
Panonychus ulmi Bryobia rubrioculus (χειμερινά ωά & προνύμφες)														
Panonychus ulmi Bryobia rubrioculus Tetranychus urticae	Propargite 57%β/ο, fatty acid potassium salt ¹													
Aculus fockeui = Aculus cornutus	Propargite 57%β/ο													

¹ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και πριν τη συγκομιδή

 Συνιστώμενες επεμβάσεις όταν κρίνονται αναγκαίες

 Πιθανές επεμβάσεις