

Αντιμετώπιση του ιού του μωσαϊκού της αγγουριάς (*Cucumber mosaic virus, CMV*) στην τομάτα

Στη γεωργική πράξη δεν υπάρχει κανένα θεραπευτικό μέτρο κατά των ιώσεων της τομάτας και η αντιμετώπιση της ασθένειας αυτής βασίζεται στην εφαρμογή των πιο κάτω προληπτικών μέτρων:

1. Αποφυγή, όσο είναι δυνατόν, εγκατάστασης αγρών τομάτας κοντά σε καλλιέργειες άλλων λαχανικών ή καλλωπιστικών φυτών ή συγκαλλιέργειας τομάτας με άλλα φυτά, κυρίως κολοκυνθοειδή.
2. Συστηματική καταπολέμηση των ζιζανίων μέσα και κοντά στα σπορεία και στους αγρούς, τόσο πριν από τη σπορά ή τη φύτευση, όσο και μετά.
3. Συστηματικός έλεγχος των σπορείων και απομάκρυνση των φυταρίων που τυχόν έχουν προσβληθεί ή παρουσιάζουν ύποπτα συμπτώματα.
4. Χρησιμοποίηση υγιών φυταρίων για μεταφύτευση.
5. Έλεγχος των φυτών σε συχνά διαστήματα, μετά τη μεταφύτευσή τους στον αγρό ή το θερμοκήπιο, και απομάκρυνση όσων εμφανίζουν συμπτώματα ίωσης.
6. Μείωση στο ελάχιστο της επαφής των φυτών μεταξύ τους. Αποφυγή επαφής των υγιών φυτών με τα χέρια εργατών που έχουν έρθει σε επαφή με ασθενή φυτά (εκρίζωση, δέσιμο, κλάδεμα, κλπ.) εκτός εάν έχουν προηγουμένως πλυθεί καλά.
7. Τα μέτρα 5 και 6 πρέπει να εφαρμόζονται σχολαστικά ιδιαίτερα στις περιπτώσεις νεαρών φυτών και στα σπορεία.
8. Καταπολέμηση των αφίδων στον αγρό και στο θερμοκήπιο.
9. Εκρίζωση και καταστροφή των υπολειμμάτων της καλλιέργειας.